

本  
草  
從  
新

# 原序

余先世藏書最夥凡有益於民用者購之尤亟以故岐黃家言亦多海內希見之本余自髫年習制舉業時卽旁覽及焉遇有會意輒覺神情開滌於是盡發所藏而精繹之迄今四十年矣夫醫學之要莫先於明理其次則在辨證其次則在用藥理不明證於何辨證不辨藥於何用故拙著醫學十種其一曰一源必徹其二曰四診須詳於經義病情必斟酌羣言而期於至當也而又念天之生藥凡以濟斯人之疾苦者也有一病必有一藥病千變藥亦千變能精悉其氣味則千百藥中任舉一二種用之且通神不然則歧多而用眩凡藥皆可傷人況於性最偏

本草綱目卷之八  
駁者乎自來註本草者古經以下代有增訂而李氏綱目爲集大成其徵據該洽良足補爾雅詩疏之缺而以備醫學之用則病其稍繁腫之者有繆氏之經疏不特著藥性之功能且兼言其過劣其中多所發明而西昌喻嘉言頗有異議最後新安汪氏祖述二書著備要一編卷帙不繁而採輯甚廣宜其爲近今膾炙之書也獨惜其本非岐黃家不臨證而專信前人雜採諸說無所折衷未免有承誤之失余不揣固陋取其書重訂之因仍者半增改者半旁掇舊文叅以涉歷以擴未盡之旨書成名曰本草從新付之剞劂庶幾切於時用而堪羽翼古人矣乎其餘數種將次第刊布與有識者商之

乾隆丁丑歲三月上巳日敝水吳儀洛遵程書於

之利濟

堂

本草從新

藥性總義

凡酸屬木入肝、苦屬火入心、甘屬土入脾、辛屬金入肺、鹹屬水入腎、此五味之義也。

凡青屬木入肝、赤屬火入心、黃屬土入脾、白屬金入肺、黑屬水入腎、此五色之義也。

凡酸者能瀉、能收、苦者能瀉、能燥、能堅、甘者能補、能和、能緩、辛者能散、能潤、能橫行、鹹者能下、能<sup>音</sup>硬、堅、淡者能利、竅、能滲泄、此五味之用也。

凡寒熱溫涼氣也、酸苦甘辛鹹淡味也、氣爲陽、味爲陰、氣無形而升故

本草從新

總義

為陽味有質而  
降故為陰

氣厚者為純陽薄為陽中之陰味厚者為純陰薄

為陰中之陽氣薄則發泄

厚則發熱

陽氣上行故氣薄者能泄於表厚者能發熱

味

厚則泄薄則通

陰味下行故味厚者能泄於下薄者能通利

辛甘發散為陽酸苦涌

湧泄為陰

辛散甘緩故發肌表酸收苦泄故為吐瀉

鹹味涌泄為陰淡味滲泄為陽

輕清升浮為陽重濁沉降為陰清陽出上竅

本乎天者親上上竅七謂耳目口鼻

濁陰出下竅

本乎地者親下下竅二謂前後二陰

清陽發腠理

腠理肌表也陽升散於皮膚故清陽

發濁陰走五臟

陰受氣於五臟故濁陰走之

清陽實四肢

四肢為諸陽之本故清陽實之濁

陰歸六腑

六腑傳化水穀故濁陰歸之

此陰陽之義也

凡輕虛者浮而升重實者沉而降味薄者升而生

象氣薄者降春

而收

象

氣厚者浮而長

象

味厚者沉而藏

象

味平者化而成

土

氣厚味薄者浮而升，味厚氣薄者沉而降。氣味俱厚者能浮能沉，氣味俱薄者可升可降。酸鹹無升，辛甘無降，寒無浮，熱無沉。此升降浮沉之義也。李時珍曰：升者引之以鹹，寒則沉而直達下焦；沉者引之以酒，則浮而上至巔頂。一物之中有根升梢降，生升熟降者是升降在物亦在人。也。○凡根之在土中者，半身以上則上升，半身以下則下降。雖一藥而根梢各別用之，或差服亦罔效。

凡質之輕者上入心肺，重者下入肝腎。中空者發表，內實者攻裏。為枝者達四肢，為皮者達皮膚，為心為幹者內行臟腑，枯燥者入氣分，潤澤者入血分。此上下內外各以其類相從也。

凡色青味酸氣臊

臊為木氣所化

性屬木者皆入足厥陰肝，足少陽膽

經

肝與膽相表裏，膽為甲木，肝為乙木。

色赤味苦氣焦

焦為火氣所化

性屬火者皆入手

少陰心手太陽小腸經心與小腸相表裏色黃味甘氣香香為

土氣所化性屬土者皆入足太陰脾足陽明胃經脾與胃相表裏胃

色白味辛氣腥腥為金性屬金者皆入手太陰肺手陽明大腸

經肺與大腸相表裏色黑味鹹氣腐腐為水性屬水者皆入

足少陰腎足太陽膀胱經腎與膀胱相表裏膀胱為壬水腎為

甲丙戊庚壬皆屬陰故為乙丁己辛癸也十二經中惟手厥陰心包絡手少陽三

焦經無所主其經通於足厥陰少陽厥陰主血諸藥入厥陰血

分者併入心包絡少陽主氣諸藥入膽經氣分者併入三焦命

門相火散行於膽三焦心包絡故入命門者併入三焦此諸藥

入諸經之部分

人之五臟應五行金木水火土子母相生經曰虛則補其母實則瀉其子又曰子能令母實如腎為肝母心為肝子故入肝者併入腎與心肝為心母脾為心子故入心者併入肝與脾心為脾母肺為脾子故入脾者併入心與肺脾為肺母腎為肺子故入肺者併入脾與腎肺為腎母肝為腎子故入腎者併入肺與肝此五行相生子母相應之義也

凡藥各有形性氣質其入諸經有因形相類者如蓮藕似心而入心荔枝核似

畢九而入有因性相從者如潤者走血分燥者入氣分本乎有

因氣相求者如氣香入脾氣焦入心之類有因質相同者如頭入類幹入身枝入肢皮行皮又

如紅花蘇木汁似自然之理可以意得也

有相須者同類而不可離也

如黃蘗知母破故紙胡桃之類

為使者我之佐使

也惡者奪我之能也畏者受彼之制也反者兩不可合也殺者

制彼之毒也此異同之義也

肝苦急急食甘以緩之

肝為將軍之官其志怒其氣急急則自傷反為所苦故宜食甘以緩之則急者

可平柔能制剛也

肝欲散急食辛以散之以辛補之以酸瀉之

木不宜鬱故欲

以辛散之順其性者為補逆其性者為瀉肝喜散而惡收故辛為補而酸為瀉

心苦緩急食酸以收之

心藏神其志喜喜則氣緩而心虛神散故宜食酸以收之

心欲栗急食鹹以栗之用鹹補之

以甘瀉之

心火太過則為躁越故急宜食鹹以栗之蓋鹹從木化能相濟也心欲栗故以鹹栗為補心苦緩故以甘

緩為瀉

脾苦溼急食苦以燥之

脾以運化水穀制水為事溼勝脾則反傷脾土故宜食苦以燥之脾

欲緩急食甘以緩之用苦瀉之以甘補之

脾貴充和溫厚其性欲緩故宜食甘以緩

之脾喜甘而惡苦故肺苦氣上逆急食苦以泄之肺主氣行治節之令氣病

則上逆於肺故急肺欲收急食酸以收之用酸補之以辛瀉之

肺應秋氣主收斂故宜食酸以收之肺氣宜聚不宜散故酸收為補辛散為瀉腎苦燥急食辛以潤之

開腠理致津液通氣也腎為水藏藏精者也陰病者苦燥故宜食辛以潤之蓋辛從金化水之母也其

能開腠理致津液者以辛能通氣也水中有真氣惟辛能達之氣至水亦至故可以潤腎之燥腎欲堅急食苦

以堅之用苦補之以鹹瀉之腎主閉藏氣貴周密故腎欲堅宜食苦以堅之也苦能堅故為補鹹

能更堅故為補此五臟補瀉之義也

酸傷筋酸走筋過則傷筋而拘攣辛勝酸辛為金味故勝木之酸苦傷氣苦從火化故傷肺氣火剋

金也又如陽氣性升苦味性降氣鹹勝苦鹹為水味故勝火之

為苦過則不能舒伸故苦傷氣鹹勝苦苦○按氣為苦傷而

用鹹勝之此自五行相制之理若以辛助金而以甘泄苦亦是法蓋氣味以辛甘為陽酸苦鹹為陰陰勝者制之以陽陽勝

者制之以陰何非勝復之妙而甘傷肉酸勝甘酸為木味故辛

傷皮毛辛能散氣故傷皮毛苦勝辛苦為火味故鹹傷血鹹從水化故傷

食鹹則渴甘勝鹹甘為上味故此五行相剋之義也

辛走氣氣病無多食辛五味論曰多食之令人鹹走血血病無

多食鹹血得鹹則凝結而不流五苦走骨骨病無多食苦苦性

陰也骨屬腎亦陰也骨得苦則沈陰欲盛甘走肉肉病無多食

甘甘能緩中善生脈滿五味論曰酸走筋筋病無多食酸酸能

筋得酸則縮五味論曰多食之令人癰瘡小便不利也此五病之所禁也

多食鹹則脈凝泣同而變色水能剋火故病在心之脈與多食

苦則皮槁而毛拔火能剋金故病在肺之皮多食辛則筋急而

爪枯金能剋木故病在肝之筋多食酸則肉胝脇音而唇揭皮

厚也子足脾賦之謂木能剋土故病在脾之肉與唇也五味篇曰脾病禁酸多食甘則骨痛而髮落

土能剋水故病在腎之骨與髮也五味篇曰腎病禁甘此五味之所傷也

風淫於內治以辛涼佐以苦甘以甘緩之以辛散之風為木氣金能勝之

故治以辛涼過於辛恐反傷其氣故佐以苦甘苦勝辛甘益氣也本性急故以甘緩之風邪勝故以辛散之熱淫於

內治以鹹寒佐以甘苦以酸收之以苦發之熱為火氣水能勝之故治以鹹寒佐

以甘苦甘勝鹹所以防鹹之過也苦能泄所以去熱之實也熱盛於經而不斂者以酸收之熱鬱於內而解者以苦發之

溼淫於內治以苦熱佐以酸淡以苦燥之以淡泄之溼為土氣燥能除之

故治以苦熱酸從木化制上者也故佐以酸淡以火淫於內治苦燥之者苦從火化也以淡泄之者淡能利竅也

以鹹冷佐以苦辛以酸收之以苦發之相火畏火也故宜治以鹹冷苦能泄火辛能散

火故用以爲佐酸收苦燥淫於內治以苦溫佐以甘辛以苦下  
發義與上文熱淫同治燥爲金氣火能勝之治以苦溫苦從火化也佐以甘辛木受  
之金傷以甘緩之金之正味以辛瀉之也燥結不通則邪實於  
內故當以寒淫於內治以甘熱佐以苦辛以鹹瀉之以辛潤之  
苦下之  
以苦堅之寒爲水氣土能制水熱能勝寒故治以甘熱甘從土  
化熱從火化也佐以苦辛等義加藏氣法時論曰瘡  
苦燥急食辛以潤之腎欲堅食此六淫主治各有所宜也  
苦以堅之用苦使之鹹瀉之也  
凡藥須俟製焙畢然後秤用不得生秤溼潤藥皆先增分兩燥  
乃秤之

凡酒製升提疆製溫散入鹽走腎而軟堅用醋注肝而收斂童  
便除劣性而降下米泔去燥性而和中乳潤枯生血蜜甘緩益  
元陳壁土藉土氣以補中州麴煨麴製抑酷性勿傷上膈黑豆

甘草湯漬竝解毒致令平和羊酥豬脂塗燒咸滲骨容易脆斷

去穰者免脹去心者除煩此製治各有所宜也

本草所謂黑豆烏豆皆黑大豆

也蘇頌曰緊小者為雄入藥尤佳宗奭曰小者力更佳皆謂黑大豆中之較小者非世俗所稱馬料豆也世俗所謂馬料豆即穰豆也穰豆性溫熱味濇劣乃豆中最下之品以其野生價最賤北方甚多故餵馬用之蓋凡豆皆可作馬料而莫有如此豆之價廉也○今藥肆中煮何首烏不用黑大豆而用穰豆甚謬竝有將煮過首烏之穰豆偽充淡豆豉尤屬可笑○市醫每有以穰豆皮加入煎劑者不知黑大豆之皮有可用穰豆之皮無可用也因時珍混註穰豆即小黑豆以致後人多誤

用藥有宜陳久者

收藏高燥處又必時常開看不令徵蛀

有宜精新者如南星半

夏麻黃大黃木賊櫻櫚芫花槐花荊芥枳實枳殼橘皮香櫟佛

手柑山茱萸吳茱萸燕窩蛤蚧沙糖壁土秋石金汁石灰米麥

酒醬醋茶蘆芥艾墨蒸餅諸麴諸膠之類皆以陳久者為佳或

取其烈性滅或取其火氣脫也凡煎阿膠鹿膠等止宜微火令小沸不得過七日若日數多火  
氣太重雖陳之至久火氣終不能脫服之不惟無益反致助火  
傷陰也○煎膏子亦宜微火并不可入煎○陰虛有火之人一  
應藥餌食物最忌煎炒脩合丸子宜將藥切絕薄片子蒸爛熟  
搗爲丸若用火製焙不但不能治病反致發火傷陰舊疾必更  
作餘則俱宜精新若陳腐而欠鮮明則氣味不全服之必無效  
也唐耿湜詩云朽藥誤新方正謂是矣此藥品有新陳之不同用  
之貴各得其宜也

本草從新凡例

一註本草者當先註明其所以主治之由與所以當用之理使讀之者有義味可咀嚼也茲集藥性病情互相闡發庶便資用若每處皆釋則重複煩瑣反生厭瀆故前後間見或因藥論辨讀者彙觀而統會之可也

一上自神農本草經以至李氏綱目俱遞有收載自綱目以後收載絕少如燕窩之類用治甚多從前俱所失收茲集俱爲增入

一自古本草以至近今本草俱有是名而今竝無是藥者如預知子之類俱爲削去

一藥品主治諸家析言者少統言者多如治痰之藥有治淫痰者有治燥痰者諸書第以除痰概之頭痛之藥有治內傷頭痛者有治外感頭痛者諸書唯言治頭痛而已此皆相反之證未可混施舉此二端其餘可以類推矣又止言某病宜用而不言某病忌用均屬闕略茲集竝加詳註庶無貽誤

一每藥先辨其氣味形色次著其所入經絡乃爲發明其功用而以主治之證其列於後其所以主治之理卽在前功用之中不能逐款細註讀者詳之

一徐之才曰藥有宣

上升下  
行日宣

通補瀉瀉滑燥溼

卽潤  
也

輕重十種

是藥之大體而本經不言後人未述凡用藥者審而詳之則

靡所失遺矣今爲分闡以標於本藥之上

此十劑也陶隱居多寒熱二劑茲不

具述然本集燥劑卽陶氏之熱劑而通劑乃徐氏之燥劑也

一藥品主治已註明某臟某腑者則不更言入某經絡以重複無用也

一陰陽升降浮沈已詳於藥性總義中故每品之下不加重註一採用諸書悉標其名氏使知爲先哲名言有可考據也間有刪節數行數句者以限於尺幅也有增改數句數字者務暢其文義也其間廣搜博採義圖貫通取要刪繁詞歸雅飭庶幾爽觀者之心曰云爾

一凡假藥不可不辨如花草子偽沙苑蒺藜香藥偽枳實枳殼

之類始則以僞亂真漸至真者絕少數百年來從無一人起而指摘之者此類甚多茲集俱正其誤

一同是藥名而力量厚薄懸殊性味優劣迥別如野白朮與種白朮并江西白朮之類至肉桂中洋桂黃連中新山連更害人之尤者也茲集俱細爲分別

一本藥而雜別種在內用者卽不能取效如肆中柴胡夾雜白頭翁小前胡遠志苗丹參等於內不細爲揀去不唯無益而反有害矣亦斷不可不正之

一藥品脩治必須如法今肆中熟地黃用煮菟絲餅加麴之類製治乖方斷不可用俱爲正之

一凡可以救荒者收載稍繁以其有裨於生成之實用也  
一養生與治病食物之宜否關係非細故收載不厭其繁



本草從新總目

草部 山草類五十四種

人參 珠兒參 黨參 土人參 西洋人參

北沙參 空沙參 甘草 黃精 萎蕤 黃芪

野白朮 種白朮 蒼朮 桔梗 天麻 秦朮

柴胡 前胡 獨活 羌活 防風 升麻

細辛 遠志 金毛狗脊 淫羊藿 巴戟天

瑣陽 肉蓯蓉 白芨 三七 地榆 丹參

元參 苦參 龍膽草 黃連 胡黃連 黃芩

紫草 知母 貝母 白頭翁 白前 白薇

白茅根

白鮮皮

延胡索

落得打

開金鎖

冬蟲夏草

錦地羅

水仙根

芳草類三十四種

當歸

芍藥

芎藭

牡丹皮

澤蘭

馬蘭

鬱金

蘘黃

蓬莪朮

荆三稜

香附

木香

砂仁

白荳蔻

草荳蔻

草果

肉荳蔻

破故紙

益智子

蛇牀子

華菱

良薑

藿香

白芷

藁本

香薷

荊芥

紫蘇

雞蘇

薄荷

甘松香

山柰

爛醃草

茉莉花

陸草類六十五種

生地黃 草地黃 熟地黃 鱧腸 麥門冬 甘菊花

穀精草 草決明 決明子 木賊草 麻黃 刺蒺藜

沙苑蒺藜 芡實 夏枯草 青蒿 連翹

紫花地丁 漏蘆 惡實 大小薊 馬鞭草

劉寄奴 紅花 王不留行 瞿麥 篇蓄

車前子 錢心 地膚子 冬葵子 海金沙 茵陳

葶藶子 大青 青黛 蘆根 豨薟草 旋覆花

紫苑 款冬花 牛膝 續斷 胡蘆巴 艾葉

木賊 雞冠花 元寶草 雪裏青 萬年青 白米飯草

淡竹葉 蒼實 箬 芭蕉根 苧麻根 萱草

石龍芮

狗尾草

敗醬

薇銜

蚤實

石龍芻

酸漿

鼠麴草

毒草類三十種

附子

草烏頭

白附子

天南星

半夏

常山

藜蘆

大戟

甘遂

商陸

芫花

續隨子

牽牛

蓖麻子

貫衆

射干

蚤休

玉簪

大黃

蘭茹

天名精

山慈姑

茵芋

莽草

仙茅

菴耳

木鼈子

鳳仙子

土連翹

煙

蔓草類二十八種

何首烏

菰絲子

覆盆子

五味子

天門冬

百部

馬兜鈴

枯樓仁

天花粉

王瓜

白礬

山豆根

金銀花

薔薇根

上茯苓

草薺

防己

木通

通草

天仙藤

葛根

茜草

紫葳花

威靈仙

釣藤鉤

使君子

旋花

雀梅葉

水草類七種

澤瀉

石菖蒲

蒲黃

水萍

海藻

海帶

昆布

石草類六種

石斛

骨碎補

石葦

金星草

景天

地錦

苔類三種

海苔

卷柏

馬勃

木部

香木類二十五種

柏子仁

側柏葉

松脂

杉材

肉桂

桂心

桂枝

辛夷

沉香

丁香

白檀香

紫檀香

降真香

烏藥

乳香

沒藥

血竭

楓香脂

安息香

蘇合香

龍腦香

樟腦

阿魏

蘆薈

胡桐淚

喬木類二十四種

黃蘗

槐實

苦楝子

秦皮

樗根白皮

櫻櫚

沒石子

訶黎勒

厚朴

皂莢

皂莢刺

肥阜筴

水楊枝葉

西河柳葉

榆白皮

海桐皮

杜仲

合歡皮

蕪荑

烏相木根皮

蘇木

乾漆

大風子

巴豆

灌木類二十八種

桑根白皮

乾桑枝

乾桑葉

乾桑葚

楮實

枳實枳殼

梔子

酸棗仁

蕤仁

山茶苗

金櫻子

郁李仁

女貞子

五加皮

枸杞子

地骨皮

石楠葉

蔓荊子

木槿

木芙蓉

狗骨

南燭

枸橘葉

山茶花

密蒙花

八角金盤

柞木

荆瀝

苞木類四種

竹瀝

竹筴

竹葉

天竹黃

寓木類六種

琥珀

茯苓

茯神

豬苓

雷丸

桑寄生

果部

五果類六種

杏仁

巴旦杏仁

烏梅

桃仁

栗

大棗

山果類十五種

梨

柿

木瓜

山楂

橘皮

青皮

香櫞

香櫟

花紅

枇杷葉

烏梅

石榴皮

銀杏

胡桃

榛

夷果類九種

荔枝核

龍眼肉

橄欖

榧子

海松子

檳榔

大腹皮

枳椇子

落花生

味類五種

川椒

秦椒

胡椒

吳茱萸

茶

蘇類五種

瓜蒂

西瓜

甘蔗

白沙糖

紫沙糖

水果類十種

蓮子

石蓮子

蓮蕊鬚

藕節

藕

荷葉

菠薐 芡實 藟 藟 慈菇

菜部 葷辛類二十三種

韭 葱白 薤 大蒜 薑薑 白芥菜

蔓青子 萊菔子 萊菔 生薑 薑汁 薑皮

煨薑 乾薑 黑薑 胡荽 大茴香 小茴香

胡蘿蔔 水芹 旱芹 蓮藕菜 白菜

不滑類二十種

菠菜 薺菜 莧菜 馬齒莧 生菜 藟莧

蒲公英 翹搖 萁菜 羊蹄 蓼菜 黃瓜菜

魚鱉草 蕨 芋 土芋 山藥 甘藷

百合

竹筍

蔬菜類七種

茄子

壺盧

冬瓜

南瓜

越瓜

胡瓜

絲瓜

水菜類五種

茭白

紫菜

海粉

石花菜

龍鬚菜

芝栢類四種

木耳

香蕈

磨菰蕈

雞塊

穀部

麻麥稻類十一種

胡麻

大麻仁

小麥

浮小麥

大麥

穠麥

蕎麥

野麥

糯米

粳米

秈米

稷粟類十六種

稷

黍

粱

粟

稊

稭子

蜀黍

玉蜀黍

菰米

東廬子

蓬草子

蒭草子

蒭草子

稗

薏苡仁

御米殼

菽豆類十二種

黑大豆

黃大豆

白豆

赤小豆

綠豆

豌豆

蠶豆

豇豆

白藟豆

穉豆

刀豆

黎豆

造釀類十六種

淡豆豉

大豆黃卷

豆腐

陳廩米

粥

蘇餅

麵筋

麥粉

神麪

紅麪

麥麪

穀芽

飴糖

醬

醋

酒

金石部

金類八種

金

自然銅

銅青

鉛

鉛丹

蜜陀僧

古文錢

鐵

玉類三種

雪母

白石英

紫石英

石類二十六種

硃砂

水銀

輕粉

銀硃

雄黃

石膏

滑石

赤石脂

禹餘糧

爐甘石

無名異

鍾乳

石炭 石灰 海石 陽起石 慈石 代赭石

空青 石膽 礬石 砒石 青礬石 花蕊石

石燕 石蟹

鹵石類十二種

食鹽 戎鹽 凝水石 元精石 朴硝芒硝

元明粉 硃砂 礬砂 石硫黃 白礬 綠礬

消石

水部 天水類十六種

立春雨水二節內水 驚蟄春分清明穀雨四節內水

小滿水 梅雨水 重午日午時水 神水

立秋處暑白露秋分四節內水

寒露水

霜降水

液雨水

大雪冬至小寒大寒及臘日水

明水

露水

霜

臘雪

冰

地水類十七種

潦水

半天河水

流水

井泉水

醴泉

玉井水

乳穴水

溫泉

阿井水

山巖泉水

海水

地漿

百沸湯

生熟湯

鑿水

氤氣水

銅壺滴漏水

火土部

火類十種

桑柴火

炭火

蘆火竹火

燈火

燈花

艾火

神鍼火

火鍼

燧火

陽火陰火

土類十種

白堊

黃土

伏龍肝

東壁土

墨

釜臍墨

百草霜

梁上塵

驗

孩兒茶

禽獸部

原禽類十種

燕窩

石燕

夜明砂

五靈脂

雀

雀卵

白丁香

鴿

雞

烏骨雞

雉

水禽類七種

白鶴血

鵝鵝油

鵝

鶩

鳧

鷓鴣

鷓鴣

林禽類二種

斑鳩

鵲

畜類九種

豬

狗

羊

牛

牛黃

黃明膠

阿膠

驢溺

白馬溺

獸類十五種

虎骨

象皮

犀角

熊膽

羚羊角

鹿茸

鹿角

麋茸麋角

麝香

貓胞

豬獾

狗獾

兔尿

獺肝

膃肭臍

昆蟲二種

獼鼠矢 狷皮

蟲魚鱗介部 化生類五種

桑蟲 蟬蛻 螻蛄 蜃蟲 蠃蟲

卵生類十一種

蜂蜜 露蜂房 蟲白蠟 五倍子 桑螵蛸 白殭蠶

原蠶砂 斑貓 蠍 水蛭 糞蛆

溼生類四種

蟾蜍 田雞 蜈蚣 白頸蚯蚓

有鱗類十八種

鯉魚 鰱魚 鮠魚 青魚膽 勒魚 鱸魚

白魚

鱖魚

鰻魚

嘉魚

鮠魚

石首魚

鮓魚

鰱魚

鯽魚

魴魚

鱖殘魚

金魚

無鱗類十五種

鱧魚

鰻鱺

鰱魚

鮓魚

海蠔蛸

海蛇

鰐

海鰐

海馬

河豚

帶魚

鯊魚翅

鱈魚

鱈鱈魚

海參

龍類四種

龍骨

龍齒

蛟鯉

蛤蚧

蛇類四種

蛇蛻

蟒蛇膽

白花蛇

烏梢蛇

龜鼈類三種

龜板

鼈甲

蟹

蛤蚌類十六種

牡蠣

蛤粉

蚌粉

蜆粉蜆肉

真珠

石決明

蛭

魁蛤

淡菜

田螺

螺螄

海螵

吐鐵

江珧柱

西施舌

利殼片

人部

十四種

髮

牙齒

人中黃

金汁

人中白

童便

秋石

乳汁

月水

口涎唾

人氣

初生臍帶

人胞

人骨

本集所錄凡七百二十有餘種視備要加五之二於世所常用之品庶幾備矣惟是藥性每隨時地而少異故陶隱居嘗云諸藥所生皆的有境界今之雜藥多出近道氣力性理豈得相似李東垣亦云失其地則性味或異失其時則氣味不全是知古人已兢兢慮之況至今日而產藥之地尤多遷變加以人情不古作偽多方自非別白精詳何以擴前聞而詔來哲汪氏備要之作彙集羣言厥功甚偉而辨訛考異非其所長亦此書之缺陷也洛識學淺陋茲所重訂凡素所涉歷而知之眞者已謹爲訂正餘則姑仍其舊惟冀海內格致精深之士各出新知匡余不逮斯實洛之幸亦不獨洛之幸矣

乾隆丁丑中冬月長至前三日吳儀洛又書

本草從新卷一目錄

草部 山草類五十四種

人參 珠兒參 黨參 土人參 西洋人參

北沙參 空沙參 甘草 黃精 萎蕤 黃芪

野曰朮 種白朮 蒼朮 桔梗 天麻 秦艽

柴胡 前胡 獨活 羌活 防風 升麻

細辛 遠志 金毛狗脊 淫羊藿 巴戟天

瑣陽 肉蓯蓉 白芨 三七 地榆 丹參

元參 苦參 龍膽草 黃連 胡黃連 黃芩

紫草 知母 貝母 白頭翁 白前 白微

白茅根 白鮮皮 延胡索 落得打 開金鎖 冬蟲夏草  
錦地羅 水仙根

本草從新卷一

草部 山草類

人參 大補元氣生陰血亦瀉虛火

甘溫微苦大補肺中元氣李東垣用藥法象曰肺主氣肺氣旺則臟腑之氣皆旺精自生而形

自盛十劑曰補可去弱人參羊肉補形瀉火東垣曰參芪甘草退火之聖藥按煩勞則

虛而生熱得甘溫以益元氣除煩生津止渴開心益智心氣強則

善思而聰耳明目洗與服俱佳安神定魂魄止驚悸通血脈行氣

則血破堅積氣運則積化消痰水氣旺則痰行水消氣壯而胃自開氣和

而食自化治虛勞內傷傷於七情六慾飲食作勞為內傷宜養正傷於風寒暑溼燥火為外感宜

祛邪如發熱證外感則發熱無間內傷則時熱時止惡寒證外感雖絮火不除內傷則得暖便減頭痛證外感則常痛不

休內傷則時痛時止外感則手背熱內傷則發熱自汗  
手心熱外感則鼻塞不通內傷則口淡無味  
虛宜參芪補氣亦有因肺熱汗多者服參芪汗必更多宜清  
熱而兼養血汗自止矣○凡外感風邪每多發熱汗脈必浮  
緩而外證亦自可辨  
**虛欬喘促** 陳嘉謨本草蒙筌曰欬有肺熱還傷  
肺之句惟言寒熱不辨虛實若肺中

實熱者忌之虛  
**心腹寒痛** 方書謂痛無補法以其氣實  
傷寒

熱者服之何害  
膚淺之輩不察虛實但見發熱動手便攻且曰傷寒無補法  
獨不觀仲景傷寒論立三百九十七法而治虛寒者一百有

奇垂一百一十三方而用  
**瘟疫** 瘟疫病陽脈濡弱正虛也陰  
人參附子者五十有奇乎  
脈弦緊邪實也正虛邪實則

一團毒邪內熾莫能解散病固纏身爲累而冬不藏精之人  
觸其氣者染之尤易所以發表藥中宜少用人參三五七分

以領出其邪喻嘉言  
**嘔噦反胃** 瘧瀉痢皆理胃培脾之功  
寓意草中論之甚詳

腸而爲瀉痢雖日久宜清肺之化源及風入腸  
胃而致久瀉久痢宜祛風邪從肌表出俱忌用  
**淋瀝** 肺氣化

而不脹滿  
皇甫嵩本草發明云胸膈逆滿宜補之而脹自除  
頭數  
經所謂塞因塞用也俗醫泥於作飽不敢用不知

少用反滋壅多用則宜多夢紛紜離魂異疾有人覺臥則身

通補之正所以導之也別蓋臥則魂歸於肝此由肝虛邪襲魂不歸舍病名離魂夏

子益奇疾方同龍齒赤茯苓砂各一錢臨睡煎服三服愈

妊娠吐水酸心腹痛不能飲食惠民和劑局方炮薑等分爲末生地黄汁和丸桐子大每服五十丸米湯下

胎產諸虛小兒慢驚痘科險證凡痘證顏色嬌紅而不蒼老或頂陷或皮薄漿清或癢塌

泄瀉俱屬氣虛宜用○若因肺熱燥不大行及外科陰毒癰

齧後難脫者均忌泄瀉由於肺熱者亦忌之出膿後收口其效尤

神慘藥用之亦妙因虛失血古人治大失血脈孔洪者並用人參氣旺則能攝血也又

凡血脫者須益其氣蓋血不自生須得生陽氣之藥乃生陽

生則陰長之義也若單用補血無由而生矣若火氣方逆血

熱妄行則咸忌之氣虛甚者濃煎獨參湯進之挾寒者稍加附子

按人參功能在諸藥之上但閉氣肺有火熱及肺氣不利者

忌之實表表有邪者忌之凡痧痘斑毒欲出未出但悶熱而

人參 參條 參鬚 二 草 部

不見點若誤用之以阻截其路為禍尤烈 產遼東寧古臺

出者光紅結實船廠出者空鬆鉛塞並有糙有熟宜隔紙焙

用忌鐵不宜見風日茯苓為使畏五靈脂惡皂角黑大豆紫

石英人溲反蒸蘆

李言聞曰東垣理脾胃瀉陰火交泰丸內用人參皂角是惡而不惡也古方療月閉

四物湯加人參五靈脂是畏而不畏也又療痰在胸膈人參

蒸蘆同用而取其湧越是激其怒性也非洞奧達權者不能知也○凡先血不止人參和薑

便服即止因相惡而效下也

參條 生津補氣 乃橫生蘆頭上者其力甚薄止可用以調

理常病及生津止渴其性橫行手臂凡指臂無力者服之甚

效

參鬚 生津補氣

亦橫生蘆頭上而更細者其性與參條同

而力尤薄要知參條參鬚不過得參之餘氣危險之證斷難倚仗

太子參 大補元氣 雖甚細如參條短緊堅實而有蘆紋其

力不下大參

參蘆 宣涌吐然亦有補性

苦溫涌吐虛勞痰飲 吳綬曰人

蘆代瓜蒂朱丹溪本草補遺曰人參入手太陰補陽中之陰蘆則瀉太陰之陽亦猶麻黃苗能發汗根能止汗也痰在上膈在經絡宜吐之吐中就有發散之義一婦因怒而病呃作則舉身跳動昏不知人乃痰因怒鬱氣不得降以參蘆牛兩逆流水煎飲之大吐頑痰數碗大汗昏睡而安一人作勞發瘧服瘧藥變為熱病舌短痰嗽六脈洪數而滑此痰蓄胸中也以參蘆湯加竹瀝涌出頭今東洋西洋俱常用之參內痰三塊次與參芪當歸而安又有一種白皮細長名鳳凰城又有一種皮糙體鬆名泡頭東洋俱大行

參葉 大苦大寒損氣敗血其性與人參相反且無用所以從來本草內俱不載

珠兒參

補氣除肺火

苦寒微甘味厚體重補肺降火肺熱者宜之 臟寒者服之即作腹痛鬱火服之火不透發反生寒熱其性大約與西洋人參相同不過清熱之功熱去則火不刑金而肺臟受益非真能補也 出閩中須多去皮再用液水泡以其苦劣之味在外皮近中心則苦味減而稍甘

黨參

補中氣生津

甘平補中益氣和脾胃除煩渴中氣微虛用以調補甚爲平

參 按古本草云參須上黨者佳今真黨參久已難得肆中  
所賣黨參種類甚多皆不堪用唯防風黨參性味和平足貴  
根有獅子盤頭者真硬紋者偽也白黨味微甘而甚  
或功力遠不及爾

土人參

補肺氣通下行

甘微寒

蒸之極透  
則寒性去

氣香味淡性善下降能伸肺經治節使清

肅下行補氣生津治咳嗽喘逆痰壅火升久瘧熱瀝難產經

閉瀉痢由於肺熱反胃噎膈由於燥滯凡有升無降之證每

見奇效

其參一直下  
行入土最深

脾虛下陷滑精夢遺俱禁用以其下

行而滑竅也孕婦亦忌 出江浙俗名粉沙參

紅黨參即將  
此參去皮淨

煮極熟陰乾而  
成者味淡無用

本草從新

卷二

西洋人參

補肺降火

苦寒微甘味厚氣薄補肺降火生津液除煩倦虛而有火者

相宜

出大西洋佛蘭西

形似遼東人參煎之不香其氣甚薄

北沙參

補陰清肺火

甘苦微寒味淡體輕專補肺陰清肺火治久欬肺痿金受火

刑者宜之

寒客肺中作嗽者勿服

人參補五臟之陽沙參補五臟之陰肺熱者用

之白實長大者良惡防已反藜蘆

肺熱欬嗽者用沙參半兩水煎服之甚效

南沙參

補陰清肺火

功同北參而力稍遜色稍黃形稍瘠

小而短近有一種味帶辣者不可用

產臺州

空沙參

即蒼朮○寒利肺甘解毒

甘淡微寒解百藥毒利肺氣和中明目主欬嗽消渴強中

興盛不交精液瘡毒疔腫李時珍本草綱目曰薺荒寒而利

自出謂之強中肺甘而解毒乃良品也而世不知

用惜哉。人參黨參土人參洋參薺荒沙參桔梗相似不可

不辨沙參體虛無心而味淡薺荒體虛無心而味甘桔梗體

堅有心而味苦黨參體實有心而味甘土人參體實有心而

味甘淡人參體實有心而味甘微帶苦自餘味洋參雖似

結參但氣 卽甜桔梗 乃桔梗之 一類二種

甘草 有補有瀉能表能裏可升可降生陰血

味甘生用氣平補脾胃不足而瀉心火能生炙用氣溫補

焦元氣而散表寒入和劑則補益入汗劑則解肌解退肌入

涼劑則瀉邪熱入峻劑則緩正氣瀉附加之恐其僭上硝黃

意入潤劑則養陰血能協和諸藥使之不爭生肌止痛上主

入

意

甘能通行十二經解百藥毒故有國老之稱療諸癰腫瘡瘍

中滿證忌之

甘令人滿然亦有生用為瀉者以其能引諸藥至於病所經云以甘補之以甘瀉之是已

故陶隱居明醫別錄頭權藥性論竝云除滿脾健運則滿除也。又甘草得茯苓則不資瀉而反泄滿故云下氣除滿仲景有甘草瀉心湯治痞滿

大而結者良出大同名粉草

彈之有粉出

細者名

統草補中炙用宜大者瀉火生用宜細者

赤皮

甘草頭

宜涌吐

消腫導毒

在上部者效

宜入吐藥

甘草梢

達莖中

止莖中痛淋濁證用之

取其徑達莖中也

白朮

苦參乾柰為使惡遠志反大戟芫花甘遂海藻然亦有竝用

者

胡令百病方治痰癖十棗湯加甘草。又垣治結核與海藻同用丹溪治勞瘵與芫花同行非妙達精微者不知此理

黃精

平補氣血而潤

甘平補中益氣安五臟益脾胃潤心肺填精髓助筋骨除風

溼下三尸蟲以其得坤土之精粹久服不飢氣滿則不飢卻病延

年似玉竹而稍大黃白多鬚故俗呼為玉竹黃精又一種

似白芨俗呼為白芨黃精又名山生蘆恐非真者去鬚九蒸

九曬用每蒸一次必半日方透

萎蕤 卽玉竹○平補氣血而潤去風溼

甘平補中益氣除煩渴潤心肺治風溼溼毒白痛皆調風寒

熱痞瘰中風不能動搖頭疼腰痛凡頭痛不止者屬外感宜發散乍痛乍止者屬內傷

宜補虛又有偏頭風左屬風與血虛右屬痰熱與氣虛腰痛

亦有腎虛氣滯痰積瘀血風寒凡熱之不同凡挾虛挾風寒者宜萎蕤莖寒自汗一切不足之證用代參地不寒不燥大有殊

功 去毛蜜水或酒浸蒸用豉鹵熬膏良

小便猝淋萎瘵五錢芭蕉根二

座水二盞煎一盞入指石末一錢服

黃芪 補氣固表生亦瀉火生陰血

甘溫生用固表無汗能發有汗能止

丹溪曰黃芪大補陽虛自汗若表虛有邪發汗

不出者服此 溫分肉實腠理補肺氣瀉陰火解肌熱炙用補

中益元氣溫三焦壯脾胃

脾胃一虛土不能生金則肺氣先絕脾胃緩和則肺旺而肌表固實

補中即所 生血生肌

氣能生血血 排膿內托瘡癰聖藥

毒氣化則

成膿補氣故能內托癰疽不能成膿者 痘證不起陽虛無熱

死不治毒氣盛而元氣衰也痘證亦然

者宜之

合人參甘草生薑為保元湯治痘虛不起或加芎藭

益脾胃是中州藥治傷寒尺脈不至補腎元是裏藥孰權謂其補腎者氣為水母也日華大明本草謂其止崩帶者氣旺

則無陷下之患也。蒙筌曰：補氣藥多，補血藥亦從而補血。益氣湯雖用當歸，因勢寡功。被參芪所據，補血湯黃芪數倍於當歸，亦從當歸所引而補血。補血湯黃芪一兩，當歸二錢，氣藥多而云補血者，氣能生血。又有常歸為引也。為形如箭幹者佳，絲軟而嫩無了枝。故又補藥之長故名者。

芪切片外，白中黃金井玉關。入補中藥，搗扁蜜炙，如欲其稍

降鹽水炒。有謂補腎及崩帶淋濁藥宜鹽水炒。汪訥菴曰：此說非也。前證用黃芪非欲抑黃芪使入腎也。取其

補中升氣則腎受廕而崩帶淋濁之病自愈也。有上病下取下病上取補彼經而益及此經者，此類是也。達表生

用或酒炒亦可。茯苓為使，惡龜甲、白鮮皮，畏防風。東垣曰：黃芪得防風

其功益大，乃相畏而更以相使也。按黃芪極滯胃口，胸胃不寬者勿用。實表

有表邪及表旺者勿用。助氣氣實者勿用。多怒則肝氣不和

亦禁用。陰虛者宜少用，恐升氣於表而裏愈虛爾。用鹽水炒以制其升

性亦得熬膏良

野白朮補氣生血健脾燥溼

甘補脾溫和中苦燥溼經曰脾惡溼急食苦以燥之本善補氣同補血藥

用亦能補血氣能生血無汗能發有汗能止發汗如辛散之味補止汗同芍之類

脾則能進飲食祛勞倦脾主四肢虛則四肢倦怠止肌熱脾主肌肉化癥癖癥

因脾虛不運者宜用此和中則能已嘔吐定痛安胎得黃芩以健脾脾運則積化也

得艾療胎寒得參大補胎元之弱蓋燥溼則能利小便生津

液既燥溼而又生津何也汪機本草會編曰脾惡溼溼勝則

津液氣不得施化津何由生用白朮以除其溼則氣得周流而

生矣止泄瀉化胃經痰水土旺自能勝溼理心下急滿脾胃健於轉輸利腰

臍血結去周身瘰癧二證皆溼停為患溼去則安矣

按白朮贊云味重金

漿芳齡玉液百邪外禦六腑內充蓋甚言其功之廣也腎虛

者勿用有火者宜生用

寓意草中載蔣中尊病傷寒臨危求肉汁淘飯食畢大叫一聲而逝門人

問臨危索飯之時尚有法可救否徐嘉言曰獨參湯可以救之曾治一孕婦傷寒表汗過後忽喚婢作伸冤之聲知其擾動陽氣急迫無奈令進參湯不可捷得遂將白朮三兩熬濃汁一椀與服即時安妥凡力艱不能服參者重用野朮頗可代之下焦陰氣不脫而上焦陽氣驟脫者大能起死回生一產於潛者最佳今甚難得即

浙江諸山出者俱可用俗稱為天生朮有鶴頸甚長內有硃

砂點朮上有鬚者尤佳以其得土氣厚鬚乃其餘氣也其次

出宜欽者名狗頭朮冬月採者佳用糯米泔浸

借穀氣陳壁以和脾

土炒

藉土氣以助脾

或蜜水炒人乳拌用

潤以制其燥○凡炒白朮止宜炒黃若炒焦則氣味

全失熬膏良

種白朮

健脾燥溼

止可用以調補虛弱之虛者及病後調理脾胃若生死關頭

斷難恃以為治陰虛燥渴肝腎有築築動氣者勿服產

浙江台州燕山亦以冬月採者為佳竝無鶴頸與鬚反肥大

於野朮熬膏良

雲朮形長大性燥劣人或切片以雜之

江西白朮其形甚小

與浙江野朮相似雖有鶴頸而甚短其體堅實其味苦劣

朮不可得唯用台朮

為穩餘俱不可用

蒼朮

補脾燥溼宜升陽解鬱

苦溫辛烈燥胃強脾發汗除溼能升發胃中陽氣

上行雄壯能除溼治

中氣下陷下安太陰使邪氣不入脾

止吐瀉逐痰水

許叔微本事方曰蒼朮能破水飲之辟囊蓋燥脾以

去溼崇上以補脾方用蒼朮一斤大棗五十枚去皮搗油麻  
半兩水二錢研蘘汁和丸名神朮丸丹溪曰實脾土燥脾溼  
是治痰消腫滿辟惡氣為除邪氣之上品辟一切嵐瘴風寒  
之本

溼為治痿要藥

陽明虛則宗筋縱弛帶脈不引故痿促蒼朮  
陽明經藥經曰治痿獨取陽明合黃藥為二

妙散加牛膝

又能總解痰火氣血溼食六鬱

丹溪曰諸鬱皆  
因傳化失常氣

不得升降病在中焦將欲升之必先降之將欲降之必先升  
之越鞠丸用蒼朮香附蒼朮能徑入諸經疏泄陽明之溼通  
行斂瀉香附乃陰中快氣之藥一升一降故鬱散而平及脾溼下流腸風帶濁帶濁赤  
有熱傷  
血分白者溼傷氣分並有寒熱二證亦燥結多汗者忌用  
有因痰而帶濁者宜二陳加二朮升柴

出茅山堅小有硃砂點者良糯米泔浸焙乾同芝麻炒以

制其燥二朮皆防風地榆為使古本草不分蒼白陶隱居分

兩種始各施用

因溼氣身痛者蒼朮泔浸切  
煎取濃汁熬膏白湯點服

桔梗 宣通氣血 瀉火散寒 載藥上浮

苦辛平色白屬金入肺氣瀉熱兼入手少陰心足陽明胃經

開提氣血表散寒邪清利頭目咽喉開胸膈滯氣凡痰壅喘

促鼻塞

肺氣不利

目赤喉癢咽痛

兩少陰火

齒痛

陽明風熱口瘡肺癰乾咳

火鬱在肺

胸膈刺痛

火鬱上焦

腹痛腸鳴

肺火鬱於大腸

竝宜苦梗以開之爲

諸藥舟楫載之上浮能引苦泄峻下之劑至於至高之分成

功既上行而又能下氣何也肺主氣肺金清濁氣自下行耳

根桔湯治胸中痞滿不痛取其能通肺利膈下氣也骨枯

場通治咽喉口舌諸病取

其苦辛散寒甘平除熱也

去浮皮甘浸微炒畏龍膽白芨

忌豬肉

木經桔梗一名薺苳蓋桔梗薺苳乃一類有甜苦二種別錄始分薺苳條

天麻

宣祛風

辛溫入肝經氣分通血脈疏痰氣治諸風眩掉頭旋眼黑語

言不遂風溼癱瘓小兒驚癇

諸風眩掉皆屬肝木肝病不能榮筋故見前證天麻入厥陰而

治諸疾肝氣和平諸疾自廖

血液衰少及非真中風者忌用

風藥能燥血故也按

風藥同養血藥用制其燥也養血藥同搜風藥用宜其滯也古云治風先治血血行風自滅

根類王瓜

莖名赤箭明亮堅實者佳溼紙包煨熟切片酒浸一宿焙

子名還筒子定風補虛

秦艽 宜去風溼

苦燥溼辛散風去腸胃之熱疏肝膽之氣活血榮筋

風藥中潤劑散

藥中補劑 治風寒溼痺

經曰風寒溼三氣雜至合而為痺風勝為行痺寒勝為痛痺溼勝為著痺痺在於骨

則體重在肉則血滯在筋則拘攣在肉則不仁在皮則寒 通身攣急潮熱骨蒸

時珍曰手足陽明經

秦艽 柴胡

草部

藥兼入肝膽陽明有淫則手足痠痛寒熱有熱則日晡潮熱  
骨蒸宋太宗太平聖惠方治急勞煩熱秦艽柴胡各一兩甘  
草五錢為末每服三錢又方治小兒骨蒸潮熱食減瘦弱秦  
艽甘草各一兩每服一二錢錢乙小兒直訣加薄荷五錢  
疸黃酒毒腸風瀉血口噤牙痛齒下濕屬手陽明大腸經張  
牙痛及本淫勝風淫之證利大小便生乳點服兼治下部  
經風淫

虛寒小便不禁大便滑者忌用 形作羅紋相交長大黃白

左紋者良莖蒲為使畏牛乳一切瘡口不合秦

柴胡 宜發表和裏退熱升陽解鬱調經

苦微寒味薄氣升為陽主陽氣下陷能引清氣上行而平少

陽厥陰之邪熱肝膽心包三焦火時珍曰行少宜腸氣血

散結調經人第知柴胡能發表而為足少陽膽經素集清淨

之腑無出無入其經在半表半裏法當和解小柴胡湯之類是也若病在太陽服之太早則引賊入門若病入陰經復服柴胡則重虛其表最宜詳慎

治傷寒邪熱痰熱結實心下煩熱諸瘧寒熱

東垣曰諸瘧以柴胡為君位以引經之藥喻嘉言醫門法律云瘧發必有寒有熱蓋外邪伏於半表半裏適在少陽所主之界入與陰爭陽勝則熱出與陽爭陰勝則寒即純熱無寒為瘧瘧溫瘧寒多熱少為牝瘧要皆自少陽而造其極偏補偏救弊亦必還返少陽之界使陰陽協和而後愈也謂少陽而兼他經則有之謂他經而不涉少陽則不成其為瘧矣脈縱屢遷而弦之一頭眩嘔吐邪在半表半裏則多嘔吐目赤胸痞脇痛凡病多是肝木之餘宜小柴胡湯加青皮川芎白芍口苦耳聾皆肝膽熱入血室衝為即血室也男女皆有之柴胡在臟主血在經主氣胎前產後諸熱小兒痘證能散十

二經瘡疽血凝氣聚功同連翹治氣熱為少異連翹治血熱柴胡陰虛火

炎氣升者禁用產江南古城山名齋接口者佳定遠縣出者亦好

外感生用內傷升氣酒炒用根治中及下降用梢有汗欬者  
蜜水拌炒前胡半夏爲使惡阜角 按柴胡所用甚多今藥  
客入山收買將白頭翁丹參小前胡遠志苗等俱雜在內謂  
之統柴胡藥肆中俱切爲飲片其實真柴胡無幾須揀去別  
種用淨柴胡 苗主治卒聾擣汁頻滴之

銀州柴胡 宣治勞熱 治虛勞肌熱骨蒸勞瘵熱從髓出小

兒五疳羸熱 根長尺餘微白

前胡 宣解表蕩下氣治風痰

辛以暢肺解風寒甘以入脾理胸腹 氣香 苦泄厥陰 肝 之熱寒

散太陽 膀胱 之邪性陰而降功顓下氣氣下則火降而痰消 有氣

餘便是火能除實熱治痰熱哮喘欬嗽嘔逆痞膈霍亂乃手足太

火則生痰陰陽明之藥與柴胡純陽無實熱與外感者忌用柴胡前

上升入少陽厥陰者不同風藥但柴胡性升前胡性降為味甘氣香性輒冬月採者

異肝膽經風痰前胡能除之良內有硬者名雄前胡須揀去勿用半夏為使惡阜角忌火

獨活宜理伏風去溼

辛苦微溫氣緩善搜入足少陰氣分腎以理伏風治本經傷

風頭痛頭運目眩宜與細風熱齒痛文潞公藥準用獨活地

瘧癰溼痺項背強直手足反張曰瘧溼流關節痛奔豚疝瘕

腎積曰奔豚風寒溼客於腎家所致疝瘕亦然古方唯用獨活後人分二種以形

虛大有白如鬼眼節疎色黃者為獨活色紫節密氣猛烈者

爲羌活竝出蜀漢又云自西羌來者爲羌活故又名胡王使者。驗嘉言曰

羌活之獨本者即真獨活

羌活 宣理遊風發表勝溼

辛苦性溫氣雄而散味薄上升入足太陽膀胱以理遊風兼入

足少陰厥陰氣分肝腎瀉肝氣搜肝風治風溼相搏本經頭痛

同川芎治太陽少陰頭痛凡頭痛多督脈爲病督脈竝脊強

用風藥以顛頂之上惟風可到也太陽經而厥剛瘕柔瘕無汗爲剛有汗爲柔亦有血虛發中風不語

中風者宜之若頭旋目赤散肌表八風之邪利周身百節

氣血虧虛者大忌之痛爲卻亂反正之主藥 若血虛頭痛遍身痛者此屬內

證二活竝禁用

防風

宣發表去風勝溼

辛甘微溫升浮為陽搜肝瀉肺散頭目滯氣經絡留溼主上

部見血

用之為使亦能治崩

上焦風邪頭痛目眩脊痛項強周身盡痛

太陽經證

膀胱徐之才曰得慈白能行周身

又行脾胃二經為去風勝溼之

要藥

凡風藥皆能勝溼東垣曰卒伍卑賤之職隨所引散目而至乃風藥中潤燥若補脾胃非此引用不能行

赤瘡瘍

若血虛痙急頭痛不因風寒

內傷泄瀉不因寒溼火

升作嗽陰虛盜汗陽虛自汗者並禁用

同黃芪白芍又能實表止汗合黃芪白朮

名玉屏風散固表聖藥黃芪得防風而功益大乃相畏而更相使也

青州黃潤者良軟蘆糯

體豐

登州萊陽次之

關東者性硬不用惡乾蘆白薇羌花畏葶藶殺附子毒

升麻

輕宜升陽解毒

甘辛微苦足陽明太陰引經藥

脾胃參芪上行須此引之

亦入手陽明太

陰

大腸

表散風邪

引葛白散手陽明風邪同葛根能發升散陽下之汗引石膏主陽明頭痛齒痛

升散

火鬱能升陽氣於至陰之下引甘溫之藥上行以補衛氣之

散而實其表

柴胡引少陽清氣上行升麻引陽明清氣上行故補中湯用為佐使

治時氣毒瘡

頭痛

陽明頭痛連齒頰

寒熱肺癆吐膿下痢後重

後重者氣滯也氣滯于中必上行而

後能下降有病大小便秘瀉用通利藥而

久泄

經曰清氣在下則生

效重用升麻而反通丹溪曰氣升則水自降

能緩帶脈

痘瘡

升葛湯初發熱時可用痘出後或下陷泄瀉者可用少

泄脫肛崩中帶下之縮急

斑疹

成朵如錦紋者為斑隱隱見紅點不可用為其解散也

助相火而成斑衝入少陰則助君火而成疹又有內傷陰證見斑疹者微紅而稀少此胃氣極虛逼其無根之火游行于

外當補益氣血使中有主則氣不外游血不外散忌用升散之品

風熱瘡癰解百藥毒吐蠱

毒殺精鬼

性陽氣升味甘故也

陰虛火升者忌用

下元虛者用此升之則下元愈虛朱

眩活人書言瘀血入裏吐衄血者犀角地黃湯乃陽明聖藥如無犀角代以升麻二藥性味相遠何以云代蓋以升麻能引諸藥同入陽明也朱二允曰升麻性升犀角性降用犀角止血乃借其下降之氣清心肝之火使血下行歸經耳儻誤用升麻血隨氣升不愈湧出不止乎古方未可盡泥也

裏白外黑緊實者反名鬼臉

升麻去鬚蘆用

或有參芪補劑須用升柴而又恐其太升發者並用蜜水炒之別有一種綠升麻繆仲醇

廣筆記用治痢有效用後方卒腫毒起升麻磨醋頻塗之

細辛

宜散風寒溫行水氣潤腎燥

辛溫散風寒故諸風痺痛欬嗽上氣頭痛脊强者宜之

頤治少陰

之頭

辛散浮熱故口瘡喉痹

少陰

鼻淵齒齲者宜之

蟲蝕膿爛

水

停心下則腎燥細辛之辛能行水氣以潤之

腎燥者心亦躁火屈於水故躁

也經曰腎苦燥雖手少陰引經心乃足少陰本藥腎能通精  
急食辛以潤之

氣利九竅故驚癇耳聾鼻鼈鼻塞不聞香臭風寒溼熱入於腦故氣不宜通寒宜表溼熱宜

清有瘕肉者風眼淚下倒睫大便燥結者宜之溫經發汗能

為末吹鼻少陰之汗仲景治少陰證反發熱者麻行血下乳散結破痰

黃附子細辛湯乃治邪在少陰之表劑味厚性烈不可多用北產者細而香華陰出者最佳南產者稍

大而不香名土辛又名馬辛以其葉似馬蹄也揀去雙葉者用惡黃

芪山茱萸畏硝石滑石反藜蘆危亦村得效方暗風卒倒不省人事者細辛吹入鼻中

遠志宣散鬱通心腎

苦洩熱溫行氣辛散鬱主手少陰心能通腎氣上達於心強

志益智聰耳明目利九竅治迷惑善忘驚悸不寐證皆因心腎不交

所致皮膚中熱腎積奔豚一切癰疽敷服皆效穆希雍本草經疏曰癰疽皆從

七情憂鬱惱怒而得遠志辛能散鬱並善治痰遠志交通心腎並無補性虛

而挾滯者同養血補氣藥用資其宣導疎於太和不可多用

獨用純虛無滯者忌。山西白皮者佳山東黑皮者次之去心甘草

水浸一宿用畏珍珠藜蘆得茯苓龍骨良葉名小益精補陰

氣治虛損夢洩可於統柴胡內揀出用之

金毛狗脊平補肺腎除風寒溼

苦堅腎甘益血肝滋溫養氣治失溺不節益腳弱腰痛寒溼周

痺經曰內不在臟腑而外未發於皮獨居分肉之間慎氣不能周故曰周痺除風虛強機關利俯

仰滋腎益肝則骨健而筋強有黃毛如狗形故名去毛切酒拌蒸草薺

本草從新 金毛狗脊 淫羊藿 巴戟天 圭 草 部

爲使熬膏良

淫羊藿

補腎命

辛香甘溫入肝腎補命門益精氣堅筋骨利小便治絕陽不  
與絕陰不產冷風勞氣四肢不仁

手足麻木

相火易動遠之

一名仙靈脾北部淫羊一日百合食此藿所致故名去枝羊

脂拌炒山藥爲使得酒良

牙齒虛痛仙靈脾爲粗末煎湯頻漱大效

巴戟天

補腎祛風

甘辛微溫入腎經血分強陰益精治五勞七傷散風溼治風  
氣腳氣水腫 陰虛而相火熾者忌服 根如連珠擊破中  
紫而鮮潔者僞也中雖紫微有白糝粉色而理小暗者真也

蜀產佳

山藥根似巴戟但色白人或錯者以亂之

去心酒浸焙用覆盆子為使

丹參

瑣陽

補陽滑腸

甘溫補陰益精興陽潤燥養筋

強筋故能興陽

治痿弱滑大腸

便燥者啖

之可代苳蓉者常瀉佳

洩瀉及陽易舉而精不固者忌之

鱗甲櫛

比狀類男陽酥炙

肉苳蓉

補腎命滑腸

甘酸鹹溫入腎經血分補命門相火滋潤五臟益髓強筋治

五勞七傷絕陽不興絕陰不產腰膝冷痛峻補精血

時珍曰補而不

峻故有苳蓉之號

驟用恐妨心滑大便

功用與瑣陽相倣禁忌亦

同 長大如臂重至斤許有松子鱗甲者良酒浸一宿刷去

浮甲劈破除內筋膜酒蒸半日又酥炙用忌鐵蘇恭註唐本草曰今人所

用多草從蓉

功力稍劣

白芨 滋補肺化痰生新

苦辛而平性濇而收得秋金之令入肺止吐血摘元云試血法吐水內浮

者肺血也沉者肝血也半浮沉者心血也各肺損者能復生

之以有形生有形也人之五臟治跌打折骨酒服二錢湯火灼傷

油調惡瘡癰腫敗疽死肌去腐逐瘀生新除面上疥癩肝音

聲面黑氣乾塗手足皸裂令人肌滑 紫石英為使畏杏仁

反烏頭重舌驚口為末

乳汁調塗足心

三七 一名山漆。○瀉散瘀定痛

甘苦微溫散血定痛治吐血衄血血痢血崩目赤癰腫磨

散已破者為金瘡杖瘡要藥杖時先服一二錢則血不衝心

陽明厥陰血分之藥故治血病能損新血無瘀者勿用從廣西山洞來

者略似白芨長者如老乾地黃有節味微甘頗似人參以末

摻豬血中血化為水者真又有一種葉似菊艾而勁厚有歧尖莖有赤稜夏秋開黃花蕊如金

絲盤紐可愛而氣不香根大如牛蒡味甘極易繁衍云是三七治金瘡折傷血病甚效與南中來者不同

地榆 瀉止血

苦酸微寒性沈而瀉收汗止血皆酸飲之功入下焦除血熱治吐血崩

中腸風血鮮者為腸風隨感而見也血瘀者為臟毒積久血而發也糞前為近血出腸胃糞後為遠血出肺肝

本草部

痢

蘇頌本草圖經曰古方斷下多用之

氣血虛寒及初起者禁用

似柳根外

黑裏紅取上截炒黑用梢反行血得髮良惡麥冬

丹參

補心去瘀生新

氣平而降味苦色赤入心與包絡破宿血生新血

瘀去然安

生胎

養血

墮死胎

去瘀

調經脈

風寒溼熱襲傷營血則經水不調

瘀氣滯痰阻之不同大抵婦人

除煩熱功兼四物

一味丹參散功同四

物

湯為女科要藥治冷熱勞骨節痛風痺不隨

手足緩散不隨人用經日足受

血而能步掌

癥瘕

癥者有塊可徵瘕者假也

血虛血瘀之候

又治目赤疔痛瘡疥腫毒排膿生肌養神定志通利血脈

雖能補血長於行血無瘀斟酌用之 畏鹹水忌醋反藜蘆

元參 為無根之火補陰

苦甘微寒入肺腎二經景岳云本草言其入腎而不知其尤

管領諸氣上下清肅而不濁風藥中多用之活人書治傷寒

陽毒汗下後毒不散心下懊憹煩不得眠心神顛倒欲絕者

俱用元參以此論之治胸中氣氣之氣除煩止渴降火滋陰

瀉無根浮游之火當以元參為聖劑也解毒利咽喉通肺通二便下

明目為末米泔煮羊肝日日醮解毒利咽喉通肺通二便下

氣治頭痛火熱鼻瘡肺熱也末塗或療癰鼠瘻俱生搗敷發

斑咽痛頸下結核急喉痹風以上皆肅清癰疽疔氣溫瘧游

風潮熱骨蒸肺金為腎水之上源肺金清脾虛泄瀉者忌

取青白者

元參色本青白其黑色乃後來溼蒸蒸過再焙

勿犯銅器惡黃芪黃肉蘆棗反藜蘆

苦參 瀉濕熱祛風

大苦燥溼大寒勝熱沈降入腎消癰解毒明目止淚淚為肝熱治

夢遺滑精白朮牡蠣倍之雄豬肚丸亦治赤白帶下熱痢血痢純下清血者風傷肝也宜散風涼血

腸風瀉血溺赤黃疸又能祛風熱極生風殺蟲溼生治大風疥癩

眉脫又能解酒毒酒為溼熱之最肝腎虛而無熱者忌其氣能傷腎沈括夢

溪筆談云久用苦參擦牙遂病眼痛由其氣傷腎也糯米泔浸去腥氣蒸元參為使

惡貝母菟絲漏蘆反藜蘆

龍膽草 瀉肝膽火下焦溼熱

大苦大寒沈陰下行入肝膽而瀉火兼入膀胱腎經除下無

之溼熱與防已同功酒浸亦能外行上行治骨間寒熱腎主骨

驚癇邪氣

肝經風火

時氣溫熱熱痢疽黃脚氣

足傷溼熱則成脚氣腫而痛者為溼

脚氣宜清熱利溼搜風痛而不腫攣縮枯細者名乾脚氣宜養血潤燥舒筋

咽喉風熱赤睛弩肉

瀉肝膽火能明目元素曰柴胡為主龍膽為使目疾要藥。凡目疾初起宜發散忌寒涼

癰疽瘡疥 大

損胃氣無實火者忌之

甘草水浸一宿曝小豆貫眾為使

忌地黃

黃連

瀉火燥溼

大苦大寒入心瀉火

海藏曰瀉心實瀉脾也實則瀉其子

鎮肝涼血

凡治血防風為上部

之使黃連為中部之使地榆為下部之使

燥溼開鬱解渴除煩消心

能去心止

盜汗

涼

治熱毒諸痢

連為要藥嘉言曰治痢必先汗解其外

後調其內首用辛涼以解表次用苦寒以清裏。○痢有虛實寒熱之分白屬氣分紅屬血分紅熱白寒之說非也須憑脈

黃連

七

章

鄉

證而為涼 痞滿嘈雜吞酸吐酸因肝火鬱而成者 腹痛心痛

渴溫補 伏梁積目痛皆傷人乳浸點或合歸芍等分煎湯熱洗散熱活血亦佳 癰疽瘡疥諸瘡

皆屬心火 酒毒明目定驚止嘔熱鬱惡心兀兀飲吐可用數分 解毒除疔殺虵得

苦則 虛寒為病大忌人服黃連苦參反熱從火化也蓋炎上作苦味苦必燥燥則熱矣且苦寒

沈陰肅殺伐傷生和之氣也。或用甘草以調其苦或加人參以節制之其庶幾乎 黃連種數甚多

雅州連細長彎曲微黃無毛有硬刺馬湖連色黑細毛綉花

針頭硬刺形如雞爪此二種最佳雲南連體鬆軟毛無硬刺

古勇連產雲南古勇山 體重無毛無硬刺此二種次之水連頭又名魯連

產川體鬆有毛無硬刺又次之新山連產廣西 光黃性重斷則

淡黃色土連產處州 色黑團節馬藥中用之 雞屎連色黑細小斷則

淡綠色以上三種服之害人雲景連

產雲南

色黑斷則紅色不

入藥川中種連色黃軟毛無硬刺味微苦而薄服之無效

去毛治心火生用肝膽火豬膽汁炒上焦火酒炒中焦火鹽

汁炒下焦火鹽水炒

或童便炒

食積火黃土炒淫熱在氣分吳萸

湯炒在血分醋炒

時珍曰諸法不獨爲之引導蓋辛熱制其苦寒鹹寒制其燥性用者詳之

黃芩

龍骨爲使惡菊花元參殭蠶白鮮皮畏款冬牛膝忌豬肉

時珍

曰方有藏連丸黃連豬肚丸豈忌肉而不忌臟腑乎

殺烏頭巴豆毒

胡黃連

其性味功用竝似黃連故名

今諸家俱用以治小兒潮熱五疳等證

喻嘉言曰凡治小兒五疳卽大人五勞也

幼科知用五疳之成方而不知五勞之曲折次第初起者治之可以得效胃虛者服之有死而曰蓋膽草蘆薈黃連胡黃

連之類極苦大寒兒不能勝鹹大方亦然設妄謂五臟虛解勞之外又有實勞而恣用苦寒諸藥如是死者醫殺之爾

喫煙毒二九日解喫煙毒合茶服之效出波斯國今秦隴南海亦有之心

黑外黃折之塵出如煙者乃為真也其禁忌畏惡俱同黃連

黃芩治火除淫

苦入心寒勝熱渴中焦實火除脾家淫熱治癖癰腹痛忌用

凡腹痛有寒熱虛實食積瘀血痰淫之不同寒宜溫熱宜清虛宜補實宜攻食宜消導瘀血宜行散淫痰宜化痰利淫痛

時手不可按者為實痛邪在寒熱往來少陽黃疸五淋血閉實熱按之痛止者為虛痛

分氣逆癰疽瘡瘍及諸失血降痰丹溪曰黃芩降痰假其降火也痰因火動當先降火

解渴安胎胎孕宜清熱涼血酒炒則上行瀉肺火利胸中氣

肺主氣熱傷氣治上焦之風熱淫熱丹溪曰黃芩火嗽喉腥瀉熱所以利氣

五臭肺

目赤腫痛

黃芩得柴胡退寒熱得芍藥治痢得厚朴黃連止腹痛得桑皮瀉肺火得白朮安胎

之聖藥時珍曰仲景治少陽證小柴胡湯太陽少陽合病下痢黃芩湯少陽證下後心滿瀉心湯並用之蓋黃芩苦寒入心瀉熱除脾家溼熱使胃火不流入肺不致刑金卽所以保肺也肺虛不宜者苦寒傷土損其母也少陽證雖在半表半裏而心膈痞滿實兼心肺上焦之邪心煩喜嘔默默不欲食又兼脾胃中焦之證故用黃芩以治手足少陽相火黃芩亦少陽藥也楊士瀛直指方曰柴胡退熱不及黃芩時珍曰柴胡乃苦以發之散火之標也黃芩乃寒能勝熱折火之本也東垣治肺熱身如火燎煩躁引飲而晝盛者宜一味黃芩湯以瀉肺經氣分之火黃芩一兩煎服本事方治崩中暴下

苦寒傷胃虛寒者均宜戒胎前若非實熱而服之陰損胎

元矣

中虛者名枯芩卽片芩瀉肺火清肌表之熱

輕飄者上行

內實者名條芩卽子芩瀉大腸火

堅重者下降

上行酒炒瀉肝膽

火豬膽汁炒山茱龍骨爲使畏丹皮丹砂

紫草 瀉血熱滑腸

甘鹹氣寒入厥陰血分肝心包涼血活血利九竅通二便鹹寒性滑

治心腹邪氣也即熱及痘瘡血熱毒盛二便閉澇者血熱則毒閉得紫草

涼之則血行而毒出曾世榮活幼心書云紫草性寒小兒脾實者可用脾虛者能作瀉古方惟用茸取其初得陽氣以類

觸類用發痘瘡今人不達此理一概用之誤矣 便滑者勿用 去頭鬚酒洗

知母 瀉火補水潤燥滑腸

辛苦寒滑瀉腎家有餘之火膀胱邪熱因而上清肺金兼瀉胃熱

入二經氣分黃蘗入腎經血分故潤腎滋陰消痰定嗽止渴

除煩火入於肺則煩瀉腎家有餘之火是其本功安胎胎前

之治傷寒煩熱蓐勞骨蒸退有汗利二便消浮腫小便利則

日熱在上焦氣分結秘而渴乃肺中伏熱不能生水膀胱絕其化源宜用滲溼之藥瀉火清金滋水之化源熱在下焦血分便秘而不渴乃真水不足膀胱乾涸無陰則陽無以化宜用黃蘗知母大苦寒之藥滋腎與膀胱之陰而陽自化小便自通丹溪曰小便不通有熱有溼有氣結於下宜清宜燥宜升又有隔二隔三之治如肺不燥但膀胱熱宜瀉膀胱此正治如因肺熱不能生水則清肺此隔二之治如因脾溼不運而精不上升故肺不能生水則燥胃健脾此隔三之治瀉膀胱黃蘗知母之類清肺車前茯苓之類燥脾二朮之類○凡病皆有隔二隔三之治不獨便閉也

傷胃滑

勝令人作瀉

李士材本草元通藥性解曰苦寒肅殺非長養萬物者也世以其滋陰用治虛損則如水益深

矣

得酉良上行酒浸下行鹽水拌忌鐵

貝母

宣散結清火潤肺化痰

甘微寒瀉心火辛散肺鬱

入肺經氣分心火降則肺氣寧詩曰言采其蔞蔞即貝母也取其解

鬱潤心肺化痰治虛勞煩熱欬嗽上氣吐血咯血肺痿肺

癰喉痹目眩

火熱淋瀝上攻

小腸邪熱心與小腸相為表裏肺為氣化之源

癰瘡

化

乳閉

產難功專散結除熱敷惡瘡斂瘡口

火降邪散瘡口自斂非貝母性斂也

能

入肺治燥非脾家所喜

汪機曰俗以半夏燥毒代以貝母不知貝母寒潤主肺家燥痰半夏退燥

主脾家溼痰何可代也故凡風寒溼熱諸痰貝母非所宜也

川產最佳圓正底平開瓣

味甘

象山貝母體堅味苦去時感風痰

土貝母形大味

苦治外科證痰毒

俱去心擣用厚朴白微為使畏秦艽反

烏頭

白頭翁

瀉熱涼血

苦堅腎寒涼血入陽明血分

胃大腸

治熱毒下痢

仲景治熱痢有白頭翁湯

合黃連黃蘗秦皮東垣曰腎欲堅急食苦以堅之痢則下焦虛故以純苦之劑堅之

溫瘧寒熱齒痛骨

痛腎主齒骨鼻衄禿瘡癰疽瘕血痔偏端人之明言目消疣

血分無熱者忌藥肆中多於統柴胡內揀出用之然必

頭上云曰毛者方真得酒良

白前瀉肺降氣下痰

辛甘微寒長於降氣下痰止嗽治肺氣壅實喉中作水雞聲者服之立愈

胸膈逆滿肺實者宜否則忌也似牛膝粗長堅直脆而

易斷者白前也短小柔輒能彎不斷者白微也近道多有形色頗同以此

別去頭鬚甘草水浸一伏時焙用忌羊肉

白微瀉血熱

苦鹹而寒陽明衝任之藥利陰氣下水氣主中風身熱支滿

忽忽不知人

陰虛火旺則內熱生風火氣焚灼血厥 汁出過多血少

陽氣獨上氣塞不行而厥婦人尤多此證宜白微湯白微當歸各一兩參五錢甘草錢半每服五錢熱淋溫瘧

寒熱痠痛

寒熱作則營氣不 婦人傷中淋露 血熱孫真人千金方白微散治

胎前產後遺尿不知時白微白芍等分酒調服丹溪曰此即劉河間風病式所謂熱甚廷孔鬱結神無所依不能收禁之意也廷孔女

人溺孔也

產虛煩嘔

經疏云古方調經種子往往用之蓋不孕緣於血熱而其源起於真陰不

足陽勝而內熱故營血日枯也益陰清熱則血自生旺而有子矣須佐以歸地芍藥杜仲菴蓉等藥

血熱相

宜血虛則忌

似牛膝而短小柔輭去鬚酒洗惡大黃大戟

山茱萸

肺實鼻塞不通同貝母款冬各一兩百部二兩米飲服末一錢

白茅根

瀉火消瘀涼血止嘔

甘寒入手少陰

心足太陰陽明

脾胃 除伏熱消瘀血利小便解

酒毒治吐衄諸血

心肝火旺逼血上行則吐血肺火盛則衄血茅根甘和血寒涼血引火下降故治之

撲損瘀血搗汁服名茅花湯亦治鼻衄產淋

血閉寒熱

血瘀則閉閉則寒熱作矣淋瀝崩中熱

則傷寒噦逆

即呃逆說文曰噦氣逆也。許

肺熱喘急內熱

煩渴黃疸水腫

清火行水時珍曰良藥也世人以微而忽之惟事苦寒之藥傷沖和之氣烏足知此哉

鍼能潰膿

酒蒸服一鍼潰一孔二鍼潰二孔

花能止血

吐血因於虛

寒者非所宜也

白鮮皮

通祛風溼

氣寒善行味苦性燥入脾胃除溼熱兼入膀胱小腸行水道

通關節利九竅為諸黃風痹之要藥

一味白鮮皮湯治產後風時珍曰世醫止施之

瘡科

兼治風瘡疥癬女子陰中腫痛

溼熱乘虛客腎與膀胱所致

下部

本草從新

白鮮皮

延胡索

毒

草部

虛寒雖有溼證勿可餌也 近道處處有之以四川所產為

長江寧府滁州潤州所產俱次之根黃白而心實取皮用人

采嫩苗為菜茹惡桑螵蛸桔梗茯苓薔鼠麴已破出膿血

延胡索宜活血利氣

辛苦而溫入手足太陰脾厥陰肝能行血中氣滯氣中血

滯通小便除風痹治上下內外諸痛通則不痛癰癖崩淋月候不

調氣血不和因而產後血運暴血上衝折傷積血為活血利

氣之藥然辛溫走而不守獨用力迅宜兼補氣血藥用通經墮胎瘀滯有

餘者宜之生用破血炒用調血酒炒行血醋炒止血經事先期虛而

崩漏產後虛運均忌之根如半夏黃色而堅

落得打 宣行血止血

甘平治跌打損傷及金瘡出血並用根煎能行血酒又能止

血醋炒或搗敷苗高人許葉如薄荷根如玉竹而無節攢

爛則黏

開金鎖 宣祛風溼

苦平祛風溼治手足不遂筋骨疼痛與蒼朮當歸同用甚效

產江浙苗高三四尺葉如草解根如何首烏而無稜肉白

色而無紋略似菝葜而無刺

冬蟲夏草 補肺腎

甘平保肺益腎止血化痰已勞嗽四川嘉定府所產者最

佳雲南貴州所出者次之冬在土中身活如老蠶有毛能動  
至夏則毛出土上連身俱化爲草若不取至冬則復化爲蟲

錦地羅 瀉解毒

微苦平治山嵐瘴毒瘡毒竝中諸毒以根研生酒服一錢七  
卽解 田廣西慶遠山巖間鎮安歸順柳州皆有之根似草  
薺及枯樓根狀彼處人頗珍重之以充方物

水仙根 瀉解毒

苦微辛寒滑治癰疽及魚骨哽

花 一名金盞銀臺

主治作香澤塗身去風氣又療婦人五

心發熱

胡煥衛生易簡方同乾何葉赤芍等  
分爲末白湯調每服二錢熱自退